

PROPANTELINA TRITON®

Antiespasmódico, para vías urogenitales y/o digestivas, en comprimidos ranurados.

Uso en Medicina Veterinaria Mantener fuera del alcance de los niños.
Venta bajo receta Conservar entre 5° y 35°C.
Industria Argentina Uso en caninos y felinos

Fórmula:

Cada comprimido contienen:

Bromuro de propantelina 5 mg
Excipientes c.s.p. 150 mg

Indicaciones:

Antiespasmódico del tracto urinario en patologías tales como: cólico renal, urolitiasis, Síndrome Urológico Felino, cistitis, espasticidad, inestabilidad e incontinencia del músculo detrusor vesical, vaciamiento vesical inapropiado, anomalías de la micción.

Antiespasmódico del tracto digestivo, en patologías tales como: úlceras gastro-duodenales, estados espasmódicos del intestino (Colon irritable, colitis, diarrea), constipación espasmódica, colecistitis, disquinesias biliares.

El Bromuro de Propantelina es una droga parasimpaticolítica de acción similar a la atropina, con capacidad de inhibir los movimientos peristálticos y reducir la hiperreflexia del detrusor vesical (por dolor o irritación). Esta droga interactúa con los receptores muscarínicos de las células eferentes, y por antagonismo competitivo previene la fijación de la acetilcolina sobre las células del músculo liso, cardíaco y glándulas. Este efecto bloqueante muscarínico sería el responsable de su efecto antiespasmódico sobre el músculo liso, especialmente el gastrointestinal y urinario.

Vía de administración:

Oral.

Dosificación:

1 comprimido cada 10 kg de peso, cada 12 horas, durante 7 a 14 días o según criterio profesional.

Dosificación del principio activo:

Bromuro de Propantelina: 0.5 mg/kg/12 hs.

Efectos colaterales:

Bromuro de Propantelina: Debido a su actividad antimuscarínica, los efectos colaterales más frecuentes incluyen taquicardia, debilidad, vómito, midriasis, sequedad de membranas mucosas, disminución de la velocidad de evacuación gástrica y constipación. En felinos es relativamente frecuente observar hipersalivación.

Precauciones de Uso:

Bromuro de Propantelina: Su administración puede mejorar la actividad de drogas simpaticomiméticas, diuréticos a base de tiazidas y nitrofurantoína. El uso de

antihistamínicos, procainamida, meperidina, benzodiazepinas y fenotiazina puede aumentar la actividad de la propantelina. La propantelina retrasa la absorción de la ranitidina y disminuye la absorción de cimetidina o. No debe usarse más de 3 días en el paciente que vomita.

Contraindicaciones:

Los antimuscarínicos están contraindicados en casos de glaucoma, obstrucción pilórica o intestinal, íleo intestinal o parálisis vesical.

Toxicidad:

El producto carece de toxicidad a las dosis recomendadas. Los signos de intoxicación por propantelina incluyen excitación, retención urinaria, hipotensión, fallo respiratorio, parálisis y coma. Todos los signos asociados con sobredosis remiten luego de la suspensión medicamentosa, no registrándose secuelas clínicas.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.

Centro Toxicológico Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: 4962-6666.

Presentaciones:

Estuches conteniendo 16 y 80 comprimidos ranurados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS RECOMENDADAS:

Medicina Interna de Animales Pequeños, Editorial Intermedica, 1997. R. Nelson, C. Couto, vol III, pp 682, 715, 718.

Enfermedades del aparato urinario de perros y gatos. Editorial Intermedica, 1996. Ling, GV. 19, 132, 168, 180, 183, 200.

Terapéutica Veterinaria de Pequeños Animales XII. Editorial McGraw Hill Interamericana, 1997. Kirk, RW & Bonagura, JD, página: 1559.

Levin, RM; Wein, AJ. 1982. Direct measurement of the anticholinergic activity of a series of pharmacological compounds on the canine and rabbit urinary bladder. *J. Urol.*, 128 (2): 396-8.

Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica. Séptima edición, 1987. Editorial Médica Panamericana. A. Goodman Gilman, L. Goodman. Páginas 169-75.

Micturition disorders. Continuing education, SAMVMS52.

http://www.vetmed.wsu.edu/boeing/small_animal_medicine/mictur.htm

SENASA Certificado N° 02-284
Establecimiento Elaborador N° 8473

Director Técnico: Dr. Luis Jáuregui - Veterinario M.N. N° 6537

- En Perú importado y distribuido por: Mederi EIRL. Av. Caminos del Inca 1434, Surco, Lima.
Reg. Perú N° SENASA F.50.211.0007
- En Bolivia importado por: Importadora Representaciones I.I.P. Av. Cnel. Marzana 1001 CBBA.
Reg. SENASAG PUV-F N° 002464/08.
- En República Dominicana: Hospital Veterinario Arroyo Hondo, Eclides Morillo 76, Santo Domingo -
N° de Registro: 6654
- En Panamá: Soluciones LM S.A. Paseo Las Lomas Casa 118, Panamá - RF-6311-12
- En Ecuador importado y distribuido por: FARCOVETSA, Cacique Álvarez 625 y Cptn. Nájera,
Guayaquil - Ecuador. Reg. N° -AGROCALIDAD



Laboratorio Tritón Vet S.R.L.
Aristóbulo del Valle 1189
(C1165AGE) Capital Federal
Tel./Fax: (011) 4302-0512

f / Tritón Vet

www.triton-vet.com / info@triton-vet.com

FRENTE

DORSO

Producto: Prospecto Propantelina Tritón
Color: Magenta
Medidas: 90 x 150 mm
Escala: 1:1
Fecha: 18/06/13

ATELIER