



VADEMECUM
GANADERÍA
2022



Farcovet
protección veterinaria



Conoce

la familia **FARCOVET**

¿QUIÉNES SOMOS?

Fármacos y Cosméticos Veterinarios S.A., es una empresa ecuatoriana, especializada en la comercialización y distribución de productos veterinarios de calidad.

Enfocados en las necesidades del mercado, hemos generado alianzas estratégicas con empresas de prestigio internacional, apoyados en un staff de profesionales veterinarios y asesores de negocios, para el desarrollo del mercado veterinario.

MISIÓN

Brindar excelencia y bienestar animal.

VISIÓN

Ser líderes en nutrición y salud animal.


VALORES

- Sinergia
- Optimismo
- Nobleza
- Responsabilidad
- Integridad
- Excelencia



Un peso al destete es más que un peso.

Un tratamiento específicamente desarrollado y dirigido a cubrir las deficiencias nutricionales y sanitarias del ternero al momento del destete.



Importado y Distribuido por

 **Farcovet**
protección veterinaria



NutriminTM
Suplemento nutricional
vitamínico mineral.



**Bovicine
Max**TM
Antiparasitario interno
y externo de acción
prolongada.



Profit
Promotor de crecimiento,
desarrollo y engorde para
animales jóvenes productores
de carne.



FleanetTM
Pour on 
Antiparasitario externo
de uso Pour on.



NUTRIMIN™



No.Reg 10ABC-12484-AGROCALIDAD

Acción: Suplemento nutricional vitamínico mineral.

Indicaciones:

- Indicado para optimizar y equilibrar el metabolismo general del animal.
- Mejora el aspecto general del animal.
- Aumento del desarrollo de la masa muscular y ósea.
- Aumento de parámetros productivos: Crecimiento, ganancia de peso diaria y producción láctea, el estado del pelo (descolorido, sin brillo, reseco, frágil).
- Colabora en la recuperación de animales subnutridos o convalecientes de enfermedades infecciosas o parasitarias.
- Indicado para animales expuestos a condiciones desfavorables (estrés climático, hacinamiento, transporte, vacunación, castraciones).
- Trastornos en la reproducción (celos silentes, anestro nutricional).
- Patologías en pezuñas, queratoconjuntivitis, ceguera nocturna y enfermedad del músculo blanco.

Dosificación: Administrar por vía subcutánea.

Bovinos	1mL/50kg
Porcinos	1mL/40kg
Ovejas	1mL/25kg
Corderos	1mL/15kg

Presentaciones:

Viales por 100, 250 y 530 ml. Solución inyectable estéril.

Uso: Bovinos, Ovinos y Porcinos.

COMPOSICIÓN

Edetato de Cobre y Zinc	22,500 g
D-L Metionina	1,500 g
Fosfato Diácido de Potasio	0,200 g
Vitamina E Acetato	0,750 g
Vitamina A Palmitato	0,150 g
Calcio Cloruro	0,014 g
Selenito de Sodio	0,006 g
Agua Purificada Estéril c.s.p.	100,00 mL

CONCENTRACIÓN IÓNICA

Calcio	5 mg / 100 mL
Cobre	0,5 g / 100 mL
Zinc	1 g / 100 mL
Selenio	2,7 mg / 100 mL
Fósforo	45 mg / 100 mL

PROSEL™



No.Reg RIP-FAR-162

Acción: Suplemento nutricional vitamínico mineral.

Indicaciones:

- Promotor orgánico de crecimiento, desarrollo y fertilidad.
- Aumenta la formación de espermatozoides (cantidad y viabilidad).
- Reduce cuadros de disfunción ovárica nutricional (anestro, ovarios quísticos, cuerpos lúteos persistentes).
- Elimina las retenciones de placenta, los abortos, métritis post parto y la reabsorción embrionaria.
- Disminuye la muerte perinatal y eleva las defensas celulares y humorales en animales jóvenes.
- Revierte la enfermedad del músculo blanco, distrofias o disfunciones musculares.
- Previene el Enteque seco.
- Disminuye el recuento de células somáticas en leche.
- Promueve el engorde, desarrollo y crecimiento.
- Aumenta la producción láctea.

Dosificación: Administrar por vía subcutánea.

Bovinos	1mL/50kg
Equinos	1mL/50kg
Porcinos	1mL/40kg
Ovejas	1mL/25kg
Corderos	1mL/15kg

Presentaciones:

Viales por 100 y 530 ml. Solución inyectable estéril.

Uso: Bovinos, Ovinos, Porcinos y Equinos.

COMPOSICIÓN

Sodio Selenito (Anhidro)	0,036 g
Vitamina E Acetato (DL-Alfa Tocoferol)	0,750 g
Vitamina A Palmitato	255,000 UI
Fosfato Diácido de Potasio	1,500 g
Agentes de formulación y Agua Purificada Estéril c.s.p.	100 mL

Equivalencia por dosis sugerida cada 50 kg de peso:

REFERENCIA DE APORTE NUTRICIONAL

Selenio	0,32 mg
Fósforo	6,48 mg
Vitamina E Acetato	14,85 mg
Vitamina A Palmitato	5100 U.I.



¿PROBLEMAS REPRODUCTIVOS EN TU HATO?



VITAMINA A&E
METIONINA, FÓSFORO
SELENIO, ZINC

VITAMINA A&E
FÓSFORO, ZINC

Nutrimin + Prosel

Un tratamiento sencillo, de fácil aplicación subcutánea, seguro, a un costo muy bajo y lleno de beneficios internacionalmente probados y garantizados.

Optimiza los resultados en cada período.

PROTOCOLO BASE



30 días previo al protocolo

DÍA 0

DÍA 8

DÍA 10

Nutrimin 10ml + Prosel 10ml

DIV, Benzoato Estradiol 2ml,
Nutrimin 10ml + Prosel 10ml

Prosel 10ml

I.A.T.F.



Importado y distribuido por
Farcovet
protección veterinaria



No.Reg 9A7-11729-AGROCALIDAD

VITONAL B™

Acción: Solución iónica balanceada, específicamente desarrollada para reponer en forma instantánea el desbalance interno producido en el síndrome de vaca caída. **Provee cuatro compuestos de Calcio**

Indicaciones:

- Hipocalcemia aguda post-parto pura o combinada, Hipocalcemia aguda post-parto.
- Tetania hipomagnésica aguda,
- Hipofosfatemia aguda
- Hipokalemia
- Cetoacidosis
- Síndrome hipoenérgico
- Miositis
- Rabdomiolisis y estados generales de desbalance metabólico.
- Aumenta la producción láctea.

Dosificación: Administrar por Vía Endovenosa Lenta y Vía subcutáneo.

COMPOSICIÓN

Calcio, borogluconato	8,26 g.
Calcio, lactobionato	6,89 g.
Calcio, levulinato	5,63 g.
Calcio, hipofosfito	0,22 g.
Magnesio, lactobionato	25,69 g.
Magnesio, hipofosfito	0,86 g.
Vitamina B1	0,53 g.
Potasio, cloruro	0,022 g.
Cafeína anhidrica	0,058 g.
Agentes de formulación	100 ml.

Presentaciones:

Vial conteniendo 530 ml de solución inyectable.

Uso: Bovinos.

Urgencia vaca caída	50 a 100 mL cada 100 kg de peso	Esta dosis podrá ser repetida hasta 3 veces con intervalos de tiempo no menores a 20 minutos entre una y otra.
A las 24 horas de Urgencia de vaca caída, ya recuperado, administrar en animales de hasta 250 kg de peso.	20 ml totales, más de 250 kg de peso 40 ml totales.	Por vía subcutánea
Tratamiento de sostén	5 a 20 mL cada 100 kg	Repartidos en 4 puntos de aplicación.

UNIMAG™



No.Reg 10B-11881-AGROCALIDAD

Acción: Provee cuatro compuestos de magnesio orgánico de alta biodisponibilidad, en combinación con una sal orgánica de calcio.

Indicaciones:

- Hipomagnesemia aguda
- Mal de los avenales, síndrome hipoenérgico.
- Previo al embarque.
- Al destete precoz o anticipado.
- En el período de adaptación al feed-lot.
- Antes de pastorear rastrojos o rollos de calidad baja o medía.
- Cuando las condiciones climáticas son desfavorables y estresantes (intensos fríos, heladas, lluvias, días nublados, vientos)
- En todos los casos donde se deba prevenir o tratar de manera inmediata un desbalance nutricional de Magnesio y/o energético en la dieta.

Aporte Nutricional:

Magnesio iónico 2,52%, aporte energético 210 kcal%, calcio iónico 0,30%

Dosificación: Administrar por Vía Subcutáneo y Endovenoso.

COMPOSICIÓN

Magnesio, lactobionato	10,76 g.
Magnesio, lactato	10,075 g.
Magnesio, gluconato	9,471 g.
Magnesio, borogluconato	7,543 g.
Calcio, borogluconato	3,609 g.
Excipientes c.s.p.:	100 ml.

Presentaciones:

Vial conteniendo 530 mL de solución inyectable.

Uso: Bovinos, Ovinos y Porcinos.

Bovinos	Urgencia vaca caída	Por vía endovenosa lenta hasta 100 ml del producto.	Si el animal se levanta durante la administración, discontinuar la aplicación. Si el animal no se levanta luego de este primer tratamiento, pero su estado es normal, el tratamiento endovenoso se podrá repetir a las 6 horas.
	Tratamiento de sostén	2,5 mL / 50 kg	Por vía subcutánea repetir a los 20 días y de seguir las condiciones de campo desfavorables, repetir cada 45 días.
Ovinos y Porcinos			5,0 mL / 50 kg



LÍNEA NUTRICIONAL

PROFIT



No.Reg RIP-FAR-182

Acción: Solución inyectable oleosa que actúa como promotor de crecimiento, desarrollo y engorde para animales productores de carne.

Indicaciones:

- Incrementa la ganancia de peso diaria
- Aumenta la conversión alimenticia de proteína a músculo
- Promueve la captación y retención de nitrógeno, vitaminas y minerales dietarios, logrando un balance nutricional altamente positivo.
- Potencia el crecimiento y desarrollo osteomuscular.
- En animales luego de los 10 días de nacidos que hayan sido seleccionados exclusivamente para producción de carne, o a partir del destete, continuando con su aplicación sistemática cada 60 a 90 días.
- Profit está especialmente indicado para uso en animales jóvenes de las especies bovina, porcina y animales en las primeras etapas de engorde, desarrollo y crecimiento.

COMPOSICIÓN

Testosterona Propionato	5,20 g.
Vitamina A (Palmitato)	1 g.
Vitamina E (Acetato)	1 g.
Excipientes c.s.p.:	100 ml.

Dosificación: Administrar por Vía Subcutáneo.

Bovinos, Ovinos, Porcinos y Equinos	1-2 mL / 50 kg
-------------------------------------	----------------

Presentaciones: Viales por 100 y 250 ml. Solución inyectable estéril.

Uso: Bovinos, Ovinos, Porcinos y Equinos.

LÍNEA ANTIPARASITARIA

BOVICINE MAX™



No.Reg 3A-3B-11799-AGROCALIDAD

Acción: Antiparasitario interno y externo de acción prolongada.

Indicaciones:

Tratamiento y control de parasitosis en Bovinos y Ovinos, combate los parásitos gastrointestinales, pulmonares, sarna, piojos chupadores, ura, miasis y garrapatas.

Dosificación: Inyectable. Vía SC exclusivamente. 630 mcg/kg. Equivalente a 1 ml/50kg.

COMPOSICIÓN

Invermectina	3,15 g.
Vehículos y excipientes c.s.p.:	100 ml.

Presentación: Viales por 50, 100 y 500 ml. Solución inyectable estéril.

Uso: Bovinos, Equinos, Porcinos y Ovinos.

FLEANET POUR ON NF™



No.Reg 3B2-12060-AGROCALIDAD

Acción: Solución oleosa de uso externo, de aplicación por derrame cutáneo (pour on), para el control y tratamiento de la Mosca de los cuernos en Bovinos.

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la Mosca de los cuernos (Haematobia irritans, Horn fly) en bovinos. Puede utilizarse para el tratamiento y la prevención de infestaciones por piojos en bovinos.

Dosificación: Aplicación por derrame cutáneo (Sistema Pour on).

COMPOSICIÓN

Cipermetrina	5,00 g.
Fenitrotión	4,00 g.
Butóxido de Piperonillo	1,00 g.
Excipientes c.s.p.:	100 ml.

Presentación: Bidones autosuficientes por 1 y 5 litros. Solución oleosa de uso externo.

Uso: Bovinos.





LÍNEA ANTIPARASITARIA

FLEANET AG PLATA™



No.Reg 3B2-3B3-12628-AGROCALIDAD

Acción: Curabicheras en aerosol – Antimiásico – Antiséptico – Repelente – Cicatrizante.

Indicaciones:

Prevención y tratamiento de la miasis, en heridas en general, descole, castraciones, descorné, ombligo del recién nacido. En operaciones quirúrgicas, protegiendo la herida de una posible infección.

Dosificación: Rociar la zona afectada sosteniendo el aerosol a 15-20 cm del área a tratar. Repetir una o dos veces por día durante cuatro o cinco días. Por su válvula especial se puede aplicar en forma horizontal o invertida.

En caso de descorne, castración, descole u otros actos quirúrgicos, aplicar inmediatamente.

COMPOSICIÓN

Fenitrotión	0,538 g.
Cipermetrina al 92%	0,423 g.
Polvo de aluminio	1,538 g.
Sulfadiazina de plata	0,038 g.
Agentes de Formulación y gases Propano/Butano	100 g.

Presentación: 440mL

Uso: Perros, bovinos, caballos, ovinos, caprinos y cerdos.

LÍNEA ANTIBIÓTICA

AVICINE™



Próximamente

Acción: Antibiótico de amplio espectro contra Gram (+) y Gram (-).

Indicaciones:

: Indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas producidas por microorganismos Gram(+) y Gram(-) y Micoplasmas sensibles a la tilosina y la fosfomicina.

Dosificación: Disolver en agua o mezclarlo con el alimento. Dosificar 160 mg. por kg de peso.

COMPOSICIÓN

Fosfomicina cálcica	6 g.
Tilosina tartrato	5 g.
Vitamina E acetato	3000 UI
Magnesio gluconato	18 g.
Sodio fosfato monobásico	15 g.
Cloruro de sodio	25 g.
Glucosa anhidra	100 g.

Presentación:

Sobre de 20 gr, 100 gr y bolsa de 1 kilo.

Uso: Aves.

BATOXIL™



No.Reg 2C1-11629-AGROCALIDAD

Acción: Antibiótico bacteriostático de amplio espectro y acción prolongada.

Indicaciones:

Indicado como preventivo y curativo en procesos infecciosos causados por bacterias Gram positivas y Gram Negativas, Micoplasmas, Clamidias, Rickettsias y algunos hongos y protozoos patógenos.

Dosificación: Bovinos, Ovinos, Porcinos y Perros: 1mL/10 Kg. Vía SC. Aves: 0,25 mL/1Kg.

COMPOSICIÓN

Oxitetraciclina Base	20,00 g
Excipientes c.s.p.:	100 mL

Presentación:

Viales por 100, 250 y 500 ml. Solución inyectable estéril.

Uso: Bovinos, Ovinos, Porcinos, Aves y Perros.

LÍNEA HEPÁTICA

HEPATONE™



No.Reg 13A-11248-AGROCALIDAD

Acción: Protector y estimulante de la función hepática.

Indicaciones:

Protege y estimula la actividad hepática, corrige la difusión biliar y hepato-digestiva. Detoxificante y descongestivo hepático. Cetosis.

Dosificación: Inyectable. Vía IM, EV. Caballos y Bovinos 50 a 100 mL totales; Porcinos 10 a 20 mL totales; Ovinos 5 a 10 mL totales; Perros y Gatos 1 mL/10 kg.

COMPOSICIÓN

Sorbitol	21 g
D-L Metionina	1,5 g
Tiamina HCl	0,30 g
Ácido Tióctico	0,20 g
Excipientes c.s.p.:	100 mL

Presentación:

Vial por 100 y 250. Solución inyectable estéril.

Uso: Caballos, Bovinos, Ovinos, Porcinos, Perros y Gatos.



EQUIVERM™



No.Reg 3A-3B-11999-AGROCALIDAD

Acción: Antiparasitario endectocida de real amplio espectro contra gusanos chatos y redondos.

Indicaciones:

Tratamiento y control de nematodos, gastrointestinales, pulmonares, cestodos y estados larvarios de dípteros causantes de miasis. Contribuye al control de piojos.

Dosificación: Uso oral. 1 g/100 kg de peso.

COMPOSICIÓN

Ivermectina	2 g
Praziquantel	10 g
Excipientes c.s.p.:	100 g.

Presentación:

Jeringas dosificadoras de 6g. Gel oral saborizado.

Uso: Caballos.

TOP RACE™



No.Reg 10B-11772-AGROCALIDAD

Acción: Antiparasitario endectocida de real amplio espectro contra gusanos chatos y redondos.

Indicaciones:

- Como terapéutica de apoyo en el síndrome de sobre entrenamiento y fatiga del equino deportivo.
- Distrofia o disfunción muscular post operatorio con decúbitos prolongados o largas anestias.
- Preventivo antes y después del ejercicio intenso.
- Síndrome de mala performance.
- Fatiga del ejercicio.
- Disturbios del medio interno (electrolítico y ácido base).
- Síndrome del equino exhausto, afluttera o asincronismo o aleteo diafragmático, rabdomiolisis, enfermedad de los lunes, enfermedad del músculo blanco y como energizante o complemento del balanceo dietético del equino deportivo.
- Problemas osteoarticulares o de desarrollo en animales jóvenes y antes y/o después del parto en yeguas.
- En intoxicaciones o sobremedicación con daño hepático.

Dosificación: Inyectable. Vía EV lenta. Caballos deportivos 50 a 100 ml totales por día antes o después del ejercicio.

Presentación:

Viales por 530 ml. Solución Inyectable estéril.

Uso: Caballos deportivos. Medicación sin restricciones pre competencia.

COMPOSICIÓN

Selenito de Sodio Anhidro	0,0026 g
Magnesio. Borogluconato	28,6893 g
Calcio, Borogluconato	2,4080 g.
Potasio, Cloruro	0,0700 g
EDTA Disódico	0,0500 g
Agua Purificada Eteril c.s.p.:	100,0000 mL.

Ivermectina & Praziquantel



El antiparasitario que corre con ventaja



Richmond
Vet Pharma™



LÍNEA DERMATOLÓGICA

TRITOHAXIDIN®



No.Reg 2A-12768-AGROCALIDAD

Acción: Antiséptico para uso ótico, tópico y odontológico.

Indicaciones: Desinfección de heridas. Control de infecciones óticas. Desinfección del campo quirúrgico, prevención y/o tratamiento de contaminación bacteriana Grampositiva y/o Gramnegativa y/o fúngica de la piel. Control de tiñas producidas por *Tricophyllum* (*verrucosum*, *equinum* y *nanum*), desinfección de ubres post-ordeño, tratamiento del *Dermatophylus congolensis*, control de Metritis Contagiosa Equina, desinfección de instalaciones empleadas en la industria avícola, tratamiento de infecciones causadas por *Staphylococcus hyicus*.

Fórmula: Digluconato de Clorhexidina al 20% 2,50 g; agentes de formulación c.s.p. 100 ml.

Dosificación:

- Otitis: Preventivo: 1 a 3 ml/24hs. Curativo: 3 a 5 ml/24 hs.
- Desinfección de heridas: Topicar con el producto de acuerdo al tamaño de la misma.
- Uso ambiental: El producto puede utilizarse a su concentración original, o diluirse hasta una proporción de 1 parte del producto y 30 partes de agua.
- Uso odontológico: Irrigar la cavidad bucal mediante aspersión o aplicando el producto con gasa sobre la superficie dental.

Presentaciones: Frasco gotero, contenido 50 ml de producto. Botella con válvula atomizadora contenido 1 litro de producto. Bidón de 5 litros de producto.

Uso: Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos, Caninos y Felinos.

TRITOHAXIDIN SHAMPOO



No.Reg 2A-12767-AGROCALIDAD

Acción: Shampoo antiséptico externo.

Indicaciones: Desinfección de heridas. Control de infecciones por *Tricophyllum* spp, desinfección del campo quirúrgico. Prevención y/o tratamiento de contaminación bacteriana Grampositiva y/o Gramnegativa y/o fúngica de la piel. Control de tiñas producidas por *Tricophyllum* (*verrucosum*, *equinum* y *nanum*), desinfección de ubres post-ordeño, tratamiento del *Dermatophylus congolensis*, control de Metritis Contagiosa Equina, desinfección de instalaciones empleadas en la industria avícola, tratamiento de infecciones causadas por *Staphylococcus hyicus*.

Fórmula: Digluconato de Clorhexidina al 20% 2,50 g; agentes de formulación c.s.p. 100 ml.

Dosificación:

- Desinfección de heridas: Topicar con el producto de acuerdo al tamaño de la misma, dejar actuar al menos 10 a 15 minutos, y realizar enjuague final.
- Uso ambiental: Aplicar el producto a su concentración original sobre las superficies inertes, campo quirúrgico o manos a desinfectar. Dejar actuar durante 10 a 15 minutos, previo cepillado y finalmente enjuagar.
- Control de dermatofitosis (tiñas) o piodermias bacterianas: Mojar el animal a tratar, aplicar el producto en su concentración original de acuerdo al tamaño del mismo, cepillar y permitir la formación de espuma. Dejar actuar durante 10-20 minutos y enjuagar.

Presentaciones: Frasco conteniendo 250 ml. Botella conteniendo 1 litro. Bidón 5 litros.

Uso: Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos, Caninos y Felinos.

LÍNEA OFTÁLMICA

OCUBIOTIC CON ESTEROIDES



No.Reg 2C3-99918-AGROCALIDAD

Acción: Colirio triple antibiótico, con acción bactericida sinérgica y propiedades antiinflamatorias, analgésicas y humectantes.

Indicaciones: Procesos infecciosos e inflamatorios en general: blefaritis, queratitis, conjuntivitis, uveítis anterior, heridas e irritaciones de conjuntiva y párpados. De primera elección, previo a estudios de cultivo y sensibilidad.

Fórmula: Hidrocortisona 10,0 mg, Neomicina sulfato 5,0 mg, Polimixina B 10.000 UI, Bacitracina Zn 400 UI, Benzocaina 10,0 mg, Excipientes c.s.p. 1 ml

Dosificación: Instilar 1 gota en el ojo afectado, c/ 6 u 8 horas.

Presentación: Frasco gotero conteniendo 5 ml.

Uso: Caninos, Felinos y Equinos



LÍNEA OFTÁLMICA



No.Reg 2C3-9800-AGROCALIDAD

CIPROVET

Acción: Colirio con antibiótico de amplio espectro y principio activo cicatrizante.
 Indicaciones: Conjuntivitis bacteriana, queratitis contaminada, úlceras de córnea extensas o de difícil resolución, lesiones y/o infecciones en cámara anterior.
 Fórmula: Condroitín Sulfato 200,0 mg, Ciprofloxacina 3,0 mg, Excipientes c.s.p. 1ml.
 Dosificación: Instilar una gota en el ojo afectado c/24 hs. Puede ser utilizado a intervalos más cortos según criterio profesional.
 Presentación: Frasco gotero conteniendo 5 ml.
 Uso: Caninos, Felinos y Equinos.



No.Reg 12B2-9903-AGROCALIDAD

TEARS

Acción: Colirio, sustituto lagrimal con propiedades lacrimomiméticas, humectantes, cicatrizantes y antiinflamatorias.
 Indicaciones: Toda vez que la secreción lagrimal se encuentre disminuida o suprimida
 Fórmula: Condroitín Sulfato 200mg, Excipientes c.s.p. 1ml.
 Dosificación: Instilar una gota en cada ojo 2 a 4 veces por día.
 Presentación: Frasco gotero conteniendo 8 ml.
 Uso: Caninos, Felinos.

LÍNEA ANESTÉSICA

GRANDES ESPECIES



VADEMECUM FARCOVET

PropoVet™

Anestésico de acción rápida



Ketonal 50 - 100

Anestésico general disociativo



Yohimbine Vet

Antagonista específico de los receptores alfa 2 adrenérgicos



Xilacina 20

Potente sedante, miorrelajante analgésico no narcótico. Agonista los receptores alfa 2 adrenérgicos.



Inadrim Inyectable

Tranquilizante neuroleéptico fenotiazínico



Richmond
Vet Pharma™



UN PESO AL DESTETE ES MÁS QUE UN PESO



Nutrimin + Profit

Una garantía de salud y rápida adaptación al crecimiento, desarrollo y engorde de sus animales.

Multivitamínico+Anabólico (Testosterona 5,2g)



Importado y distribuido por

Farcovet
protección veterinaria

SÍGUENOS:



(593) 4-6060800 info@farcovetsa.com

www.farcovetsa.com